

Ficha de mi Gatito



Pega la foto de tu  
mascota aquí

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Raza:

Color:

Adquirido en:

Identificación:

Dueño:

Dirección

Fono:

## MANUAL PARA EL CUIDADO DEL GATITO

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un hermoso gatito y nosotros nos alegramos mucho. Ha tomado una decisión importante que condicionará su vida durante muchos años.

En efecto, su gato compartirá su vida cotidiana y será una compañía en el hogar durante 15 a 20 años, brindando una gran alegría a grandes y chicos.

Separado de su madre y de sus hermanos, el gatito se sentirá muy solo al llegar a la casa. Con el fin de aliviar al máximo su reciente separación, resulta indispensable organizar perfectamente su llegada al seno de la nueva familia.

### PREPÁRESE PARA RECIBIR A SU GATITO

El descubrimiento del nuevo entorno, de los nuevos miembros de la familia, de los eventuales congéneres (perros o gatos que ya se encuentran en el seno del hogar) constituye una etapa muy importante que condicionará el éxito de la integración del gatito en el nuevo hogar. Esta etapa debe desarrollarse de manera progresiva y con mucha tranquilidad.

Para que el gatito se sienta completamente seguro desde la llegada al nuevo hogar, es deseable que encuentre su "ajuar" con todos los accesorios necesarios para su bienestar, el juego, la alimentación, etc...

- **Cama:** una cama confortable donde el gatito se sentirá seguro (pero él solo elegirá su lugar para dormir)

- **Caja de Arena:** una bandeja sanitaria suficientemente profunda y una pala para retirar las heces. Lo ideal es una caja recubierta para evitar derrames y limitar olores.



- **Dos Comederos:** uno pequeño para el alimento (un gato adulto no consume más que 60 o 70 g por día) y uno más grande para el agua fresca que debe estar permanentemente a disposición.

- **El afilador de uñas:** para evitar que dañe los interiores de la casa.

- **El árbol del gato:** los gatitos adoran trepar a lugares altos (dominantes) y contorsionarse entre dos ramas. Limitará las carreras locas y las acrobacias sobre algunos muebles que responden a una necesidad de ejercicio.

- **EL collar y la correa:** el collar es el mejor y más rápido medio para la identificación del gatito; la correa es un objeto auxiliar indispensable para los eventuales paseos o traslados cortos sin empleo de la jaula de transporte.

- **Una gatera:** Se llama gatera al agujero que se hace en la pared, tejado o puerta para que puedan entrar o salir los gatos. Si usted le permite cierta libertad, debe considerar su instalación de modo de no tener que abrir y cerrar constantemente la puerta para que el gatito entre y salga. Es preferible que un gato de raza permanezca dentro de la casa.

- **Los juguetes:** elegidos o fabricados por usted.

## MANEJO ALIMENTARIO



Se deben evitar absolutamente los cambios bruscos de alimentación, que podrían causar trastornos digestivos. Se recomienda continuar, al menos durante algunos días, con el alimento que el gatito recibía anteriormente.

Infórmese a través del veterinario o del criador acerca del modo de alimentación (numero de comidas/día, raciones a voluntad) y la naturaleza de las comidas que le ofrecían.

Si desea cambiar la alimentación, deberá respetar una transición alimenticia del alimento anterior al nuevo por un periodo de una semana.

La primera alimentación luego del destete debe ser un sustituto de la leche materna: **MAMISTOP® GATO**, que puede usarse también como complemento de la alimentación a medida que crece su mascota.

La transición alimenticia permite minimizar los riesgos de heces blandas o diarreas, tan perjudiciales para el buen desarrollo del gato

No le de jamás los restos mientras usted come: lo acostumaría a mendigar y a saltar sobre la mesa. Un desequilibrio alimenticio podría favorecer la obesidad.

Por otro lado, asegúrese de que el gatito tenga siempre agua fresca a disposición y, sobre todo, permítale comer en un ambiente tranquilo.

Cambio de alimentación:

- 1er y 2do día: 75% del alimento anterior y 25% del nuevo
- 3er y 4to día: 50% anterior y 50% nuevo
- 5to y 6to día: 25% anterior y 75% nuevo
- Último día: 100% del nuevo

## REGLAS DE COMPORTAMIENTO

Lo esencial de la educación del gatito se desarrolla durante el periodo que va desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. La mayoría de las conductas se adquieren de manera efectiva a los 3 meses de edad, gracias al papel preponderante de la madre, así como de los hermanos y hermanas.

Cuando se adopta un gatito, la contribución a las bases de su educación es limitada, pero usted será el responsable de completar la educación dentro del nuevo ambiente y de corregir su comportamiento.

El gatito aprende de dos maneras diferentes: comienza por imitar los gestos de su madre, y luego aprende por si mismo mediante la experimentación. En ese caso, él actúa y recibe las consecuencias de sus actos. Si la respuesta le resulta agradable, tenderá a privilegiar esa acción.



El aseo de nuestro gatito ha estado siempre a cargo de la madre. A partir de las 5 – 6 semanas, un gatito, hace sus necesidades dentro de la bandeja sanitaria y suele dedicar mucho tiempo a recubrirlas.

Si el aprendizaje no se ha llevado a cabo, se debe colocar el gatito sobre la bandeja sanitaria, cavar un hoyo con la pata del gatito y a continuación habituarlo a recubrir sus excrementos. Repite una o dos veces la experiencia y el gatito habrá aprendido.



En ocasiones, su gatito puede orinar en sitios o artículos que usted no desee. Esto representa un comportamiento natural y un medio de comunicación. Se realiza mediante el depósito

de olores, secreciones de hormonas o por arañazos. Para evitar esto use **PET OUT®**, un producto especialmente formulado para alejar a los perros y gatos de sitios o artículos que usted determine, así terminará con los problemas que ocasiona el marcaje territorial y las malas conductas. **PET OUT®** se aplica en forma de rocío sobre la superficie elegida, repitiendo tres veces al día hasta que su gatito aprenda que ese sitio está restringido para él. **PET OUT®** no debe aplicarse directamente sobre el pelaje de la mascota. Si esto llegara a suceder, lavar con abundante agua y enjuagar en repetidas ocasiones.

Cuando su gatito no usa la bandeja sanitaria y la orina y/o las heces no son recogidas de inmediato, éstas impregnan la zona con un olor, para nosotros desagradable y para el gatito característico de “su baño”. Es por eso que siempre es recomendable levantar rápidamente los desechos (los cuales además pueden ser fuente de enfermedades importantes como los parásitos), limpiar la zona en cuestión y desodorizarla. En este punto es recomendable la utilización de **QUIT OLOR®**, el cual es un eliminador de olores ambientales. Se puede usar a discreción cuantas veces sea necesario, para desodorizar el ambiente de malos olores.

**ATENCIÓN: QUIT OLOR® no es colonia** para perros ni gatos, por lo que no se debe aplicar directamente a su mascota.

Es por esto que es tan importante enseñarles desde muy pequeños el uso de la bandeja sanitaria.

## ENTRENAMIENTO

El entrenamiento proporciona seguridad y confianza a usted y a su mascota. Además, es una muy buena manera de comunicarse entre ambos.

El entrenamiento puede empezar cuando un cachorro tiene entre 3 y 6 meses de edad, continuando su aprendizaje a medida que crece y se convierte en adulto.

Cabe destacar que una gata madre es una excelente profesora de nuestro gatito. Adiestrar a un gato exige cariño, paciencia y constancia. Cuando más cariño demuestre usted por su gato, tanta más personalidad propia desarrollará el animal. Cada gato es un individuo encantador que espera ser descubierto. La inteligencia del gato le sorprenderá continuamente.



Normalmente cuando llegan al hogar vienen adiestrados para utilizar su caja de arena, si no es así conviene que usted deje la caja de arena en el lugar que el gatito come y duerme. Después de que el gatito haya comido, cójalo y deposítelo en la caja, es posible que en un principio se limite a escarbar y a jugar, pero se sorprenderá cuando vea con que rapidez aprende a usar la caja.

A los gatos les encanta estirar sus patas delanteras y arañar o amasar con sus uñas. Esta es una forma natural de hacer ejercicio y es un signo de satisfacción en la mayoría de los gatos, pero puede ser muy perjudicial para las paredes, los muebles y las alfombras. Cortar con frecuencia las uñas del gato también contribuirá a salvar los muebles y las alfombras.

Si piensa sacar a pasear a su gato, tendrá que adiestrarlo para el uso de correa y arnés.

### EXÁMENES RUTINARIOS

Usted y su gato serán los mejores amigos, pero hay otra persona quien también será un buen amigo: Su Médico Veterinario. Visítelo con su nueva mascota. Los gatitos deben ser vacunados a temprana edad.

Su veterinario le entregará un calendario de vacunas.

Realice chequeos regulares cada 6 meses.

- **Examen físico:** Durante el examen físico, su veterinario palpará el abdomen del gatito, auscultará el tórax para escuchar el corazón y los sonidos respiratorios, revisará la condición del pelaje, mirará los oídos por si hay infección o parásitos,



examinará los ojos para estar seguro que ellos están limpios y libres de infecciones, revisará la cavidad bucal para determinar si hay depósitos de tártaro o alteración en las encías. Su veterinario le preguntará por cualquier problema reciente de salud o si su gatito ha estado junto a otros gatitos enfermos. Para responder las preguntas que su veterinario le formula, usted necesita saber qué es lo normal. La siguiente guía le ayudará a distinguir la normalidad de una alteración.

- **Ojos:** Los ojos de su gatito deben estar brillantes y limpios. Cualquier descarga o secreción debe despertar su preocupación y seguir la evolución de este signo. También observe si hay hinchazón o protuberancias en los párpados.

- **Oídos:** Los oídos de su gato deben estar limpios y libres de descarga y olor. Limpie rutinariamente los oídos usando **DRAGOVIN®** ó **LIMPIOTIC®**. Los ácaros del oído, común en perros y gatos, son unos parásitos muy pequeños, que producen una secreción de color negro. Un tratamiento veterinario es necesario para eliminar estos parásitos. Un descuido de cualquier inflamación o infección de los oídos puede llevar a cronicidad (enfermedad progresiva) la que puede presentarse con dolor, debiendo en aquellos casos que no remitan con tratamiento local, solucionarse con cirugía.

- **Nariz:** La nariz de su gatito debe estar limpia y húmeda sin descargas o heridas.

- **Hocico:** Examine el hocico de su gato periódicamente. Las encías deben estar rosadas y saludables. Los dientes de su gato tienen que ser examinados y limpiados por su veterinario cuando usted detecte que tengan sarro acumulado, ya que los depósitos de tártaro pueden llevar a una enfermedad en las encías, a la pérdida de

dientes, o bien, a una enfermedad sistémica producto de la placa bacteriana junto a las encías.

- **Cuerpo y Pelaje:** Toque el cuerpo del gatito para determinar la existencia de tumores o protuberancias. Pase su mano a contrapelo para ver si hay pulgas, caspa o suciedad.
- **Ano:** Examine el ano de su gato por si existiera una infección o parásitos intestinales. Ambas condiciones necesitan tratamiento veterinario.

**Vacunaciones:** Estas serán administradas durante las visitas a su Médico Veterinario. No tenga miedo en preguntarle cualquier inquietud relacionada con la salud de su gato. Su Médico Veterinario es la mejor fuente de información y debe convertirse en su mejor aliado para la buena salud de su familia y mascota.

### CALENDARIO DE VACUNACIÓN PARA LOS GATOS.

EDAD	¿QUE LE CORRESPONDE?
2 meses	Vacuna Triple Felina
3 meses	Vacuna Triple Felina
4 meses	Vacuna Triple Felina
6 meses	Vacuna Antirrábica
1 año	Vacuna Antirrábica
ANUAL	Vacuna Triple Felina/ Antirrábica



### COMO ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO

Si su gato está enfermo, su Médico Veterinario probablemente prescribirá un medicamento oral. Si tiene que ingerir tabletas, la forma más fácil es presionar los labios del gato para que abra la boca y en ese momento empujar el comprimido hasta el fondo con los dedos. Si de esta manera no resulta, puede machacar el comprimido, disolverlo en agua y dárselo con una jeringuilla sin aguja. Su Médico Veterinario le mostrará como dar el comprimido directamente cuando sea necesario. Si su gatito debe recibir un medicamento líquido, incline la cabeza del gato hacia atrás y tire de la piel que rodea la boca para que se forme una especie de embudo. Dele luego el jarabe con una cuchara.

### ENFERMEDADES COMUNES

La salud de su gatito no sólo es importante para usted. Esta preocupación se traduce en numerosas investigaciones de Médicos Veterinarios y laboratorios farmacéuticos a través del mundo. Fruto de estas investigaciones, han sido desarrolladas medicinas y vacunas que proporcionan salud y protección a muchas enfermedades. Al momento de ser vacunado, su gatito debe estar sano al examen clínico, libre de parásitos y bien alimentado. Una alimentación con ingredientes de alta calidad trabajará junto a la vacuna para construir anticuerpos y resistir las enfermedades.

Dentro de las enfermedades más comunes de los gatos encontramos:

- **Rabia:** La rabia es una dolencia grave que suelen transmitir los animales salvajes. También el ser humano puede contagiarse y, por este motivo es importante reconocerla cuanto antes. Se manifiesta a través de trastornos repentinos del comportamiento y parálisis de los miembros. La muerte suele presentarse al cabo de pocos días.

- **Panleukopenia felina (FPL):** La panleukopenia, o enteritis infecciosa felina, es una enfermedad vírica que se adquiere a través del contacto con otros gatos. El período de incubación puede tomar entre dos y nueve días. El virus ataca al intestino y causa vómitos, diarreas y hemorragias intestinales, que llevan rápidamente a la deshidratación. También implica una disminución drástica del número de glóbulos blancos en la sangre. Sus síntomas más visibles son la presencia de sangre en las heces, la fiebre continuada y el abatimiento. Aunque puede curarse con un tratamiento adecuado, en los gatos jóvenes los síntomas suelen agravarse y causar la muerte.

- **Peritonitis Infecciosa Felina (PIF):** La peritonitis infecciosa felina (PIF) se transmite por contacto con otros gatos, por comer o beber en el mismo cuenco o a través de la ropa. Causa graves epidemias, sobretodo entre los animales que viven en colonias. Los síntomas más conspicuos son ataques de fiebre, pérdida de peso, vómitos, diarreas, hinchazón abdominal y dificultades respiratorias. Es una enfermedad difícil de tratar y puede ser fatal.

- **Rinotraqueítis vírica felina (FVR):** La rinotraqueítis está producida por un virus que ataca los conductos nasales y la traquea del gato. Los primeros síntomas son estornudos constantes y, posteriormente, el gato desarrolla una conjuntivitis severa. También puede presentar fiebre, tos, lagrimeo y estornudos continuos, exceso de salivación, presencia de mucosidades purulentas, infecciones bacterianas y sinusitis. Si se consulta a tiempo con el veterinario, puede ser tratada con éxito.

- **Leucemia felina (FeLV):** La leucemia felina causa diariamente la muerte de muchos gatos en el mundo; al igual que el virus de la inmunodeficiencia felina, causante del SIDA felino, ataca el sistema inmunológico de los gatos, dejándoles indefensos ante enfermedades que de otra forma podrían resistir. Los síntomas más comunes son la pérdida de peso, diarrea continuada, los vómitos y los problemas respiratorios. A nivel interno, puede causar tumores cancerígenos y daño en órganos como el hígado o en el sistema nervioso. Una vez se ha producido la infección, no hay cura y



sólo puede aliviarse el sufrimiento del paciente para que tenga mejor calidad de vida. Los gatos enfermos suelen morir al cabo de dos años.

Para evitar el contagio del virus hay que vacunar a los gatos anualmente y evitar que tengan contacto con gatos callejeros, pues la enfermedad puede adquirirse por el solo hecho de beber agua en el mismo lugar que un gato infectado. La madre también puede transmitirla a sus crías en el útero.

Las siguientes son alteraciones posibles de encontrar en gatos, y usted las debe conocer para comunicárselas a su Médico Veterinario.

- **Diarrea:** Puede ser causada por varios factores, incluyendo bacterias, virus, parásitos intestinales, sustancias tóxicas, ciertos alimentos o trastornos psicológicos. Una disfunción orgánica, especialmente de hígado o páncreas, también puede causar

diarrea. La diarrea se puede tratar eliminando todo alimento por 24 horas y proporcionando solamente agua fresca, y tratando con **DIARREPAS®** en casos necesarios. Llame a su Médico Veterinario si la diarrea es sanguinolenta, si el volumen de la diarrea es muy grande, si su gato está débil, deshidratado, tiene síntomas de otra enfermedad o si la diarrea continúa por más de 24 horas. Después que su gato se recupere, vuelva a su dieta regular ofreciendo pequeñas cantidades de alimento, alrededor de 3 a 6 veces al día.

- **Constipación:** Al igual que la diarrea, la constipación puede ser causada por muchos factores, incluyendo ingestión de sustancias como pelo, huesos o material extraño, poca ingesta de agua y algunas enfermedades. Su Médico Veterinario puede necesitar tomar muestras de sangre, radiografías, ecografías u otras pruebas para encontrar la causa de la constipación. Además su Médico Veterinario le recomendará una dieta alta en fibra. Usted puede ayudar promoviendo a que su gato haga más ejercicio, y que no coma huesos u otras materias indigestibles.

- **Vómito:** Es posible que su gato vomite ocasionalmente. Sin embargo, llame a su Médico Veterinario si los vómitos ocurren más de cinco veces en pocas horas, el volumen del vómito es muy grande, el vómito contiene sangre o está acompañado por diarrea o dolor abdominal.

## CONTROL PARASITARIO

Los parásitos pueden ser peligrosos para su familia y su mascota, si no están bajo control. Los siguientes parásitos son comunes y usted debe conocerlos.

### PARÁSITOS EXTERNOS

**Pulgas y Garrapatas:** Un buen tratamiento debe ser efectivo contra los parásitos sobre su mascota y los que están en el ambiente, y a su vez, inocuo para su gato y usted. Recuerde que la pulga se alimenta de la sangre de su gatito y que no está presente siempre sobre el gato; el desarrollo larvario también ocurre fuera del gato. Las pulgas pueden sobrevivir muchos meses sin alimentarse y entonces desarrollar un apetito voraz, el que manifiestan a través de su picada. Por otro lado, una garrapata hembra, puede colocar entre 2.000 y 4.000 huevos, los que pueden permanecer biológicamente activos hasta por



tres años. Para obtener óptimos resultados controle los parásitos en su mascota y los parásitos del medio. Para esto, use los métodos de la siguiente lista, dependiendo de las condiciones climáticas y las facilidades para usted y su mascota:

- **Spray:** **FIPROKILL® SPRAY:** Lo más efectivo en el control de pulgas y garrapatas en perros y gatos. Producto a base de fipronil, que altera el sistema nervioso central de los parásitos provocándoles la muerte.

En presentaciones de 100 y 250 mL en spray. Se puede utilizar en cachorros desde los 2 días de vida. En perros su eficacia contra garrapatas es de 90 días, y 30 días contra pulgas. En gatos, protege por hasta 30 días contra pulgas. Permite baños 48 horas antes y después de su aplicación.

- **Antiparasitarios Pour-On:** Son muy fáciles de aplicar y muy efectivos en el control de pulgas y garrapatas en perros y gatos: **FIPROKILL® PIPETA:** En presentación única para gatos. Se puede utilizar desde las 10 semanas de edad. Tiene una duración de hasta 5 semanas contra las pulgas.

Fiprokill® Pipeta permite baños 48 horas antes y después de su aplicación, sin perder su eficacia.

**Tiña:** La tiña es una infección por hongos (micosis) que afecta a la piel de los gatitos más que a la de gatos adultos. La infección es transmitida desde otro gatito o desde los hongos del suelo. El síntoma clásico es la aparición de una costra o un círculo con pérdida de pelo. La tiña puede ser transmitida a las personas, especialmente a los niños. Su Médico Veterinario examinará las áreas sin pelo y las lesiones para asegurar el diagnóstico, e implementará una serie de baños como tratamiento. Puede prevenir bañando con shampoo **REGAPIPEL PLUS®**, moje al animal con abundante agua, luego aplique una cantidad suficiente de shampoo, masajee y deje actuar por 10 minutos y enjuague con abundante agua, para luego secar el pelaje. Repita el baño 2 veces por semana o según indicación Médico Veterinario.

### PARÁSITOS INTERNOS

Los parásitos internos, tales como los vermes o protozoarios, afectan principalmente a los gatitos, mucho más receptivos que los gatos adultos.

Dentro de los vermes hay dos especies muy frecuentes en los gatitos:

- **Áscaris:** Se alojan dentro del intestino delgado del gatito, forman pelotas y pueden causar oclusiones intestinales. La detección puede



hacerse mediante la observación de huevos en las deposiciones del gatito o en las zonas anales.

- **Tenias:** Se fijan sobre la pared intestinal y causan hinchazón de vientre, diarreas y a veces alteraciones del pelaje. La detección se realiza por la presencia en las heces de anillos blancos semejantes a granos de arroz.

Dentro de los protozoarios hay dos que infectan principalmente a gatitos:

- **Giardias:** Fijadas sobre la mucosa del intestino delgado, provocan una digestión incompleta, diarreas y adelgazamiento progresivo.
- **Coccidios:** Parásitos del aparato digestivo sin síntomas visibles.

El ciclo de vida de los parásitos intestinales tiende a fomentar la reinfestación. Los gatitos pueden nacer con ellos, o recibir las larvas a través de la leche de su madre. Para estos casos, **INVERMIC GOTAS®** o **NANORMEN SUSPENSIÓN®** son indicados desde los 15 días de vida de su mascota. Los parásitos adultos producen huevos, los que son eliminados por medio de las deposiciones. Estos huevos (o larvas) pueden infectar a otro animal. Los huevos de Tenias son ingeridos por pulgas que diseminan la enfermedad cuando un perro o gato accidentalmente come una pulga. Las hembras deben ser desparasitadas antes de cruzarse, deben ser tratadas con **PRAZIVERMIC®** o **NANORMEN® PLUS GATOS** para evitar que las larvas pasen a los fetos a través de la sangre. Su Médico Veterinario puede detectar parásitos intestinales por la presencia

de huevos y administrar uno de los medicamentos mencionados. Las fecas deben ser recogidas frecuentemente para prevenir la diseminación de huevos y larvas.

A continuación el calendario de las desparasitaciones:

<b>EDAD</b>	<b>¿QUE CORRESPONDE?</b>
15 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (GATO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
30 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (GATO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
45 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (GATO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
60 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (GATO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
75 DÍAS	DESPARASITAR CON INVERMIC (GATO) o NANORMEN SUSPENSIÓN
3 MESES	DESPARASITAR CON NANORMEN PLUS GATOS
4 MESES	DESPARASITAR CON NANORMEN PLUS GATOS
5 MESES	DESPARASITAR CON NANORMEN PLUS GATOS
CADA 3-4 MESES DE POR VIDA	DESPARASITAR CON NANORMEN PLUS GATOS

### **CUIDADOS**

Los cuidados de higiene y belleza son importantes para la salud de su mascota, quien apreciará el tiempo extra que usted le entrega. Su Médico Veterinario lo guiará en relación a la frecuencia de los baños para su gato. Use un shampoo suave como **CANISH®**; nunca jabón de lavar. Siempre peine y cepille el pelaje antes de mojarlo, ya que el agua aprieta los nudos de pelo. Si el pelaje de tu gato tiende a enredarse con facilidad, como los gatos persa, puedes



utilizar **SUAVIPET®** una loción desenredante para perros y gatos especialmente formulado para razas cuyo pelaje es muy fino y que tengan predisposición a formar nudos en su pelaje. Se recomienda aplicar después del baño previo al cepillado.

## LAS BOLAS DE PELO

Como todos sabemos el gato es un animal sumamente limpio, por lo que pasa gran parte del día acicalándose, lo que genera que trague gran cantidad de pelo y lo vomite.

Muchas veces, cuando la cantidad de pelo es mucha, el gato no es capaz de eliminarlo por el vómito y se forman estas bolas de pelo, que son verdaderos tapones que se van alojando en el intestino y que finalmente se pueden extraer sólo a través de cirugía.

Para evitar este desagradable problema mascotasonline te recomienda **LAX DRAG®** un eliminador de bolas de pelo con sabor salmón. Para eliminar bolas de pelo: 2-3 cm de **LAX DRAG®** hasta que los síntomas desaparezcan. Suministrar entre las comidas, además cepíllelo regularmente. A gatitos de más de 4 semanas de edad dar 1 a 1 ½ cm de **LAX DRAG®** una o dos veces por semana.

## ALERGIAS

Los síntomas incluyen picazón, pérdida de pelo, fricción y frotación de diversas partes del cuerpo. Su mascota se lamerá o se rascará con frecuencia las orejas, las extremidades, las axilas o la ingle. Este trauma a repetición provocará a menudo infecciones crónicas. Para tener éxito con el tratamiento, deberá seguir las instrucciones de su Médico Veterinario. Las alergias pueden tratarse por varios métodos, incluidos inyecciones, medicamentos orales, champús tópicos y cremas.

## REPRODUCCION FELINA

La sexualidad es el eje de la vida de los gatos. Determinan su posición social y su territorio, sean machos o hembras, y condiciona casi todos sus comportamientos. En la época de celo, la gata experimenta fuertes cambios hormonales que pueden alterar sus rutinas y su personalidad. Entre los machos, el sexo es más bien una idea fija, y el prospecto de aparearse los hace olvidarse de cualquier otra prioridad. Están dispuestos a dejar su hogar y sus posesiones indefensas a cambio de una cita.



Por lo general, las hembras entran en celo dos o tres veces cada año. El ciclo dura entre dos y cuatro días con intervalos de dos semanas y depende de la luz solar, que estimula la producción de estrógeno en sus ovarios. En los países con estaciones, los períodos fértiles se presentan entre el final del invierno y el comienzo del otoño, pues las hembras necesitan más de doce horas de luz natural para entrar en ciclo. La presencia de luz artificial puede implicar que sean fértiles todo el año. Los machos suelen producir más espermatozoides en la primavera y en el verano.

Recuerde, si usted decide cruzar a su mascota, debe responsabilizarse por encontrar un hogar apropiado para los gatitos. Una opción para evitar los ciclos de las gatas, es usar anticonceptivos inyectables (**OVO - 6®**) u orales (**NONPET® GATAS**), siguiendo la indicación de su Médico Veterinario quien evaluará la mejor elección según sea su caso particular.

## PRIMEROS AUXILIOS

Cuando su mascota presente algún problema, es importante que usted sepa reaccionar pronta y oportunamente. Conocer los auxilios básicos es esencial para la recuperación de su mascota. Cuando usted conozca los procedimientos adecuados de primeros auxilios, podrá ayudar a su gato a recuperarse de las emergencias y además, ayudará a su Médico Veterinario.

- **Respiración artificial:** Si su gatito no respira por cinco a seis minutos, se puede producir daño cerebral. Se debe actuar rápidamente. Primero ponga a su gato de costado. Extienda su cabeza y exteriorice la lengua usando sus manos con un paño limpio para que no se le resbale. Extraiga cualquier material extraño o mucoso de la garganta usando sus dedos envueltos con un trozo de gasa. Inicie la respiración artificial poniendo sus manos sobre el pecho del gato a la altura de los codos. Presione por tres a cuatro segundos y relaje por el mismo período de tiempo. Continúe este procedimiento hasta que su gato empiece a respirar. Cuando lo haga mantenga presionado el pecho, pero no aplique mucha presión. Reduzca gradualmente la compresión. Levante a su gato de espalda, tomando hombros y caderas y póngalo en un lugar tranquilo y protegido. Llévelo a su Médico Veterinario inmediatamente.

- **Shock:** Un shock puede llevar a la muerte. Esta condición produce una gran disminución de la irrigación sanguínea hacia el cerebro y otros órganos vitales. Cuando su gato se encuentre en estado de shock presentará el pulso reducido, las encías pálidas, debilidad, disminución de la frecuencia cardíaca y la respiración alterada. Primero revise la cavidad bucal de su gato (usted podría hacer respiración artificial), luego detenga cualquier pérdida de sangre presionando directamente o usando un torniquete. Mantenga la cabeza en un nivel más bajo que el corazón, ubique a su gato en un lugar tranquilo y protegido. Llame a su Médico Veterinario inmediatamente después de estabilizar a su gato.

- **Hemorragias:** Las hemorragias pueden ser controladas de tres formas: por compresión, vendaje y por torniquete.

1. **Por compresión:** mantenga presionada el área usando un trozo de género limpio o gasa. Sosténgalo durante cuatro a cinco minutos y disminuya lentamente la presión. Si la hemorragia continúa, pruebe con compresión y vendaje. Cambie el vendaje durante la primera hora para asegurarse que la hemorragia se detuvo y también comprobar que el vendaje no está muy apretado.

2. **Torniquete:** se usa cuando la lesión está acompañada de salida de sangre en chorro o cuando la compresión, o vendaje no ayudan a detener la hemorragia. El torniquete debe estar entre la lesión y el corazón; apriete lo suficiente como para controlar la hemorragia y libere el torniquete levemente cada 15 minutos hasta constatar su detención. Luego lleve a su mascota inmediatamente a su Médico Veterinario.



3. **Vendaje:** Recuerde que el vendaje de su mascota debe estar firme pero no apretado. Un vendaje apretado puede alterar el flujo sanguíneo. Primero limpie el área con un antiséptico (también puedes usar **PETEVER®**) y agua tibia. Seque

y luego aplique una venda o cinta no adhesiva. Cúbralo con gasa y fije el vendaje con tela adhesiva en el lugar.

- **Transporte de un animal lesionado:** Siempre se debe mover a un animal lesionado, acostado sobre uno de sus lados y ojalá sobre una camilla. Usted puede hacerlo poniendo dos palos o barras unidas por medio de las mangas de una chaqueta o camisa, o usando una frazada o manta. Recuerde, cuando transporte a un animal lesionado, revíselo con precaución más podría estar en shock o sangrando. Esté atento a su hocico, ya que la mayoría de las mascotas pueden morder si están adoloridas.

- **Congelamiento:** A bajas temperaturas, una mascota puede iniciar un proceso de congelación en orejas, patas y cola. La piel congelada es pálida y lustrosa al principio y luego se torna blanco-escarchada. Entibie la piel aplicando calor, alrededor de 24°C, con toallas húmedas a la temperatura mencionada. Después que la piel se entibie, seque cuidadosamente y vende la zona afectada, sin apretar demasiado.


- **Golpe de calor:** Los síntomas del golpe de calor incluyen jadeo, espuma por el hocico, agitación extrema, depresión y coma. Si su gato tiene una temperatura sobre 41°C, puede presentar daño cerebral irreversible. Una hipertermia de su gato debe ser controlada con agua fría y/o hielo envuelto en un paño. Llame a su Médico Veterinario inmediatamente.

- **Quemaduras:** Si su mascota se ha quemado, no ponga ningún tipo de sustancia ni medicamento en la lesión. Sólo aplique agua fría o hielo envuelto en paños, mientras se dirige lo más pronto posible donde su Médico Veterinario.

- **Heridas:** Todas las heridas, ya sean grandes o pequeñas, deben ser limpiadas con agua y jabón o con algún antiséptico (Puede diluir **PETEVER®**). Si la herida es hemorrágica, aplique los primeros auxilios para hemorragias. En cortes superficiales, después de limpiar, vende (si es posible) con una cinta no adhesiva, gasa estéril o gasa de vendaje. Un corte de más de 5 cm. de longitud o más de 1 cm de ancho requiere puntos. Si su mascota se ha cortado haga lo siguiente: enfrente los bordes, aplique comprensión y vendaje. Cambie el vendaje durante la primera hora para hacer una evaluación y llévelo a su Médico Veterinario. Para una herida perforada o punzante, usted debe hacer una limpieza y desinfección profunda para evitar la formación de abscesos. Heridas de balas o perdigones necesitan ser limpiadas y desinfectadas para evitar la contaminación, pero si su mascota esta postrada, trátela como a una mascota en shock y llévela a la clínica veterinaria más cercana para un tratamiento inmediato. La cicatrización posterior puede ser estimulada usando **VULKETAN®** gel o **MIXANTIP PLUS®** crema.

- **Intoxicaciones:** Si su mascota ha ingerido accidentalmente una sustancia tóxica, como agroquímicos, veneno para ratones, anticongelantes para autos o algún medicamento humano, llévelo de inmediato a su Médico Veterinario y llame a un centro de información toxicológica para ayudarlo inmediatamente (C.I.T.U.C. 6353800 - Stgo.). No induzca vómito hasta saber fehacientemente si la sustancia que ha ingerido no es cáustica. Algunas sustancias tóxicas pueden ser más dañinas cuando son vomitadas. Si debe inducir el vómito, déle a beber agua oxigenada. **HEPROTEC®** jarabe puede ser utilizado como protector hepático durante la convalecencia.

- **Lesiones en los ojos:** Todas las lesiones oculares necesitan una urgente atención veterinaria. No aplique ningún medicamento en los ojos de su mascota y no permita que se frote. Llévelo inmediatamente a su Médico Veterinario.



- **Anzuelos:** Nunca remueva un anzuelo que se encuentre cerca de la zona de los ojos; su veterinario debe hacerlo. Para otras áreas, pase el anzuelo a través de la piel y córtelo en la púa con una herramienta apropiada, luego retírelo. Trate la lesión como una herida punzante y llame a su Médico Veterinario.

- **Déficit de Taurina:** La taurina, es un aminoácido que los gatos sólo sintetizan en cantidades muy pequeñas, no suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas del animal. Su presencia en cantidad adecuada es esencial en la dieta para prevenir las patologías asociadas a su carencia. Para suplir esta deficiencia mascotasonline te recomienda **VITADRAG®** con taurina, que es una pasta especialmente formulada para complementar la alimentación de los gatos. La ingesta adecuada de Vitaminas y minerales son indispensables para el mantenimiento normal de las funciones metabólicas del organismo animal.

